



**D** Bachforelle (Salmonide)  
**NL** Beekforel  
**F** Truite de rivière  
**GB** Brook trout

**Bachforelle**

**Andere Namen** : Waldforelle, Flussforelle, Bergforelle, Alpenforelle u.a.

**Kennzeichen** : rote Tupfen auf den Flanken; Fettflosse häufig mit dunkelrotem Rand

**Größe** : Die Bachforelle wird bis 80 cm lang und über 5 kg schwer

**Schonzeit**: 15.Oktober – 15.März

**Mindestmaß** : 25 cm

**Nahrung** : Insektenlarven, Bachflohkrebse, kleine Schnecken, auf dem Wasser treibende Insekten

**Köder** : Bienenmaden, Würmer, Blinker, Wobbler, kleine Gummifische



**D** Regenbogenforelle (Salmonide)  
**NL** Regenbogenforel  
**F** Truite arc-en-ciel  
**GB** Rainbow trout

**Regenbogenforelle**

**Andere Namen** :Teichlachs, Stahlkopf, Lachsforelle

**Kennzeichen** : schillernde, regenbogenähnliche Zeichnung der Flanken, schwarze Punkte auf Fett- und Schwanzflosse; Schwanzflosse leicht eingebuchtet

**Größe** : Die Bachforelle wird bis 70 cm lang und bis 6 kg schwer

**Schonzeit**: 15.Oktober – 15.März

**Mindestmaß** : 25 cm

**Nahrung** : Insektenlarven, Bachflohkrebse, kleine Schnecken, auf dem Wasser treibende Insekten

**Köder** : Bienenmaden, Würmer, Blinker, Wobbler, kleine Gummifische



**D** Karausche (Cyprinidae)  
**NL** Karper  
**F** Crucian  
**GB** Crucian

**Karausche**

**Andere Namen** : Bauernkarpfen, Moorkarpfen, Schneiderkarpfen

**Kennzeichen** : keine Barteln am Maul; häufig dunkler Fleck auf der Schwanzwurzel; Schwanzflosse leicht eingebuchtet; Seitenlinie 32 bis 35 Schuppen;

**Größe** : Die Karausche wird bis 35 cm lang und 1 kg schwer

**Schonzeit**: ganzjährig geschützt

**Mindestmaß** : - cm

**Nahrung** : Insektenlarven, wirbellose Bodentiere, Pflanzenteile

**Köder** : Bienenmaden, Würmer, Mais, Gerste, Brotstücke



**D** Äsche (Thymallidae)  
**NL** Vlagzalm  
**F** Ombre  
**GB** Grayling

**Äsche**

**Andere Namen** : Asch, Äscher, Springer, Spalt, Mailing, u.a.

**Kennzeichen** : große fahnenähnliche Rückenflosse; kleines Maul; Pupille vorn spitz zulaufend

**Größe** : Die Äsche wird bis 60 cm lang und bis 3 kg schwer

**Schonzeit**: 15.Feburar – 30.April

**Mindestmaß** : 30 cm

**Nahrung** : Flohkrebse, Köcherfliegen- und Eintagsfliegenlarven, Schnecken, Würmer, Egel, anfliegende Insekten

**Köder** : Bienenmaden, Würmer,



**D** Rotaug (Cyprinidae)  
**NL** Blankvoorn  
**F** Gardon  
**GB** Roach

**Rotaug**  
**Andere Namen** : Plötze, Rotteln, Schmahl, Schwalen, Furn  
**Kennzeichen** endständiges Maul; rotes Auge; Ansatz der Bauchflosse senkrecht unter dem Ansatz der Rückenflosse  
**Größe** : Das Rotaug wird bis 40 cm lang und 1 kg schwer  
**Schonzeit**: -  
**Mindestmaß** : 15 cm  
**Nahrung** : Kleinkrebse, Hüpferlinge, Wasserflöhe, Würmer, Muscheln, Schnecken, Zuck- und Büschelmückenlarven  
**Köder** Maden, Würmer, Mais, Gerste, Brotstücke



**D** Rotfeder (Cyprinidae)  
**NL** Ruisvoorn  
**F** Rotengle  
**GB** Rudd

**Rotfeder**  
**Andere Namen** : Rötél, Goldrubel, Rotflosser, Rottelen u.a.  
**Kennzeichen**: leicht oberständiges Maul; gelbes bis gelbrotes Auge; Ansatz der Bauchflosse vor dem Ansatz der Rückenflosse; gekielter Bauch;  
**Größe** : Die Rotfeder wird bis 30 cm lang und 1 kg schwer  
**Schonzeit**: -  
**Mindestmaß** : 15 cm  
**Nahrung** : Teile von Laichkräuter und Tausendblatt, vegetarisch  
**Köder** : Mais, Gerste, Brotstücke



**D** Schleie (Cyprinidae)  
**NL** Zeelt  
**F** Tanche  
**GB** Tench

**Schleie**  
**Andere Namen** : Schlei, Schlie, Schleich, Schuster, Schlammmler  
**Kennzeichen**: 2 kurze Barteln an den Maulwinkeln; kleine Schuppen; Schwanzflossenrand fast gerade;  
**Größe** : Die Schleie wird bis 50 cm lang und bis 6 kg schwer  
**Schonzeit**: -  
**Mindestmaß** : 25 cm  
**Nahrung** : Würmer, Mückenlarven, Muscheln, Schnecken, Insektenlarven  
**Köder** : Bienenmaden, Maden, Würmer, Mais, Gerste



**D** Spiegelkarpfen (Cyprinidae)  
**NL** Spiegelkarper  
**F** carpe miroir  
**GB** Mirror carp

**Spiegelkarpfen**  
**Andere Namen** : Karp, Karpf  
**Kennzeichen** : rüsselartig vorstülpbares Maul mit 4 Barteln; kräftige Hartstrahlen (Sägestrahl) an Rücken- und Afterflosse; Körper seitlich etwas abgeflacht; übergroße Spiegelschuppen unregelmäßig über den Körper verteilt;  
**Größe** : Karpfen können bis 100 cm lang und 30 kg schwer werden  
**Schonzeit**: -  
**Mindestmaß** : 35 cm  
**Nahrung** : Würmer, Mückenlarven, Muscheln, Schnecken, Insektenlarven, Wasserpflanzen,  
**Köder** : Bienenmaden, Maden, Würmer, Mais, Gerste



**D** Lederkarpfen (Cyprinidae)  
**NL** Karper  
**F** La carpe commune  
**GB** Common carp

**Lederkarpfen**

**Andere Namen :** Karp, Karpf

**Kennzeichen :** rüsselartig vorstülpbares Maul mit 4 Barteln; kräftige Hartstrahlen (Sägestrahl) an Rücken- und Afterflosse; Körper seitlich etwas abgeflacht; unbeschuppt oder nur einzelne Schuppen;

**Größe :** Karpfen können bis 100 cm lang und 30 kg schwer werden

**Schonzeit:** -

**Mindestmaß :** 35 cm

**Nahrung :** Würmer, Mückenlarven, Muscheln, Schnecken, Insektenlarven, Wasserpflanzen,

**Köder :** Bienenmaden, Maden, Würmer, Mais, Gerste



**D** Graskarpfen / Schuppenkarpfen (Cyprinidae)  
**NL** Graskarpers / Karper  
**F** La carpe herbivore / Carpe commune  
**GB** Grass carp / Common Carp

**Graskarpfen/ Schuppenkarpfen**

**Andere Namen :** Karp, Karpf

**Kennzeichen :** rüsselartig vorstülpbares Maul mit 4 Barteln; kräftige Hartstrahlen (Sägestrahl) an Rücken- und Afterflosse; Körper seitlich etwas abgeflacht; vollständig mit Schuppen bedeckt;

**Größe :** Karpfen können bis 100 cm lang und 30 kg schwer werden

**Schonzeit:** -

**Mindestmaß :** 35 cm

**Nahrung :** überwiegend Wasserpflanzen,

**Köder :** Mais, Gerste



**D** Gibel (Cyprinidae)  
**NL** Geveltop  
**F** Pignon  
**GB** Gable

**Gibel**

**Andere Namen :** Silberkarausche

**Kennzeichen :** keine Barteln am Maul; oberer Rand der Rückenflosse leicht eingebuchtet; Schwanzflosse relativ stark eingebuchtet; kein dunkler Fleck auf der Schwanzwurzel; Seitenlinie 27 bis 31 Schuppen;

**Größe :** können bis 40 cm lang und 2 kg schwer werden

**Schonzeit:** -

**Mindestmaß :** -

**Nahrung :** Würmer, Mückenlarven, Muscheln, Schnecken, Insektenlarven, Weizen, Mais

**Köder :** Bienenmaden, Maden, Würmer, Mais, Gerste



**D** Barbe (Cyprinidae)  
**NL** Barbeel  
**F** Barbeau  
**GB** Barbel

**Barbe**

**Andere Namen :** Flussbarbe, Barme, Barbel, Sauchen, Pigge, Bigge

**Kennzeichen :** unterständiges Maul mit 4 Barteln am Oberkiefer; 1 Sägestrahl an der Rückenflosse; leicht abgeplatteter Bauch;

**Größe :** können bis 80 cm lang und 7 kg schwer werden

**Schonzeit:** 1.Mai bis 15.Juni

**Mindestmaß :** 35 cm

**Nahrung :** Würmer, Insekten, Weichtiere, gelegentlich Pflanzenteile und Fischlaich

**Köder :** Bienenmaden, Maden, Würmer, Käse, Frühstücksfleisch



**D** Bachsaibling (Salmonidae)  
**NL** Bronforel  
**F** Omble  
**GB** Brook trout

### **Bachsaibling**

**Andere Namen** : Amerikanischer Saibling

**Kennzeichen** : Vorderkante der Brust- Bauch- und Afterflosse mit schwarz-weißem Saum; zahlreiche gelbe Punkte auf dem Körper

**Größe** : können bis 45 cm lang und 7 kg schwer werden

**Schonzeit**: 15.Oktober bis 15.März

**Mindestmaß** : 25 cm

**Nahrung** : Insektenlarven, Bachflohkrebse, kleine Schnecken, auf dem Wasser treibende Insekten

**Köder** : Bienenmaden, Maden, Würmer, Blinker, Spinner, Wobbler



**D** Döbel (Cyprinidae)  
**NL** Kopvoorn  
**F** Chevaine  
**GB** Chub

### **Döbel**

**Andere Namen** : Aitel, Dickkopf, Alet, AltI, Diebel, Schuppfisch u.a.

**Kennzeichen** : endständiges Maul mit tiefer Maulspalte; Afterflosse nach außen gewölbt; Schuppen mit dunklem Rand; fast drehrunder Körper;

**Größe** : können bis 70 cm lang und 6 kg schwer werden

**Schonzeit**: -

**Mindestmaß** : -

**Nahrung** : Würmer, Mückenlarven, Muscheln, Schnecken, Insektenlarven, Weizen, Mais

**Köder** : Bienenmaden, Maden, Würmer, Mais, Gerste



**D** Barsch (Percidae)  
**NL** Baars  
**F** Perche  
**GB** Perch

### **Barsch**

**Andere Namen** : Flussbarsch, Bars, Perschke, Bürschling, Egli u.a.

**Kennzeichen** : schwarzer Fleck am hinteren Ende der 2. Rückenflosse; Rückenflossen berühren sich fast an der Basis; bauchseitige Flossen rötlich; Dorn am Kiemenendeckelrand; dunkle Querbinden an den Flanken;

**Größe** : können bis 45 cm lang und 2 kg schwer werden

**Schonzeit**: -

**Mindestmaß** : -

**Nahrung** : Würmer, Mückenlarven, Muscheln, Schnecken, Insektenlarven,

**Köder** : Bienenmaden, Maden, Würmer, Gummifisch,



**D** Hecht (Esox)  
**NL** Snoek  
**F** Brochet  
**GB** Pike

### **Hecht**

**Andere Namen** : Wasserwolf, Schnuk, Schnök, Schnück, Heekt, Grashecht u.a.

**Kennzeichen** : stark bezahntes, entschnabelartiges Maul; langgestreckter Körper; Rücken- und Afterflosse am Ansatz des Schwanzstiels;

**Größe** : können bis 150 cm lang und über 50 kg schwer werden

**Schonzeit**: 1.Februar bis 15.April

**Mindestmaß** : 50 cm

**Nahrung** : Kleinfische, Amphibien, Kleinsäugetiere

**Köder** : toter Köderfisch, Gummifisch, Blinker, Spinner, Wobbler



<b>D</b>	Zander	(Pericidae)
<b>NL</b>	Snoekbaars	
<b>F</b>	Sandre	
<b>GB</b>	Pike-perch	

**Zander**  
**Andere Namen** : Schill, Saumer, Sandbarsch, Hechtbarsch u.a.  
**Kennzeichen** Kiefer mit Hundszähnen; kein Dorn am Kiemendeckel; 1. Rückenflosse mit dunklen Längsstreifen; 1. und 2. Rückenflosse an der Basis deutlich getrennt;  
**Größe** : können bis 120 cm lang und 15 kg schwer werden  
**Schonzeit**: 1.April bis 31.Mai  
**Mindestmaß** : 45 cm  
**Nahrung** : überwiegend Kleinfische,  
**Köder** : toter Köderfisch, Gummifisch, Blinker, Spinner, Wobbler



<b>D</b>	Aal	(Anguillidae)
<b>NL</b>	Paling	
<b>F</b>	Anguillee	
<b>GB</b>	Eel	

**Aal**  
**Andere Namen** : Steigaal, Flusaaal, Blankaal, Gelbaal, Glasaal, Spitzkopf, Breitkopf, u.a.  
**Kennzeichen** schlangenförmiger Körper; keine Bauchflossen; Rücken-, Schwanz- und Afterflosse bilden einen Flossensaum; Flossensaumansatz auf den Rücken weit hinter dem Kopf;  
**Größe** : bis 150 cm lang und 6 kg  
**Schonzeit**: -  
**Mindestmaß** : 50 cm  
**Nahrung** : Würmer, Schnecken, Insektenlarven, Kleinfische, Fischlaich  
**Köder** : Fischfetzen, Würmer, Maden,



<b>D</b>	Nase	(Cyprinidae)
<b>NL</b>	Sneep	
<b>F</b>	Hotu	
<b>GB</b>	Nose	

**Nase**  
**Andere Namen** : Näsling, Schwarzbauch, Rheinmakrele, Speier, Zuppe, Mundfisch, Zapfen  
**Kennzeichen** : stark unterständiges Maul; verhornte Lippen; innen schwarzes Bauchfell;  
**Größe** : können bis 50 cm lang und 2 kg schwer werden  
**Schonzeit**: 15.März bis 30.April  
**Mindestmaß** : - cm  
**Nahrung** : Algen, Flohkrebse, Würmer, Insektenlarven,  
**Köder** : Bienenmaden, Maden, Würmer,



<b>D</b>	Brassen	(Cyprinidae)
<b>NL</b>	Brasem	
<b>F</b>	Brème	
<b>GB</b>	Bream	

**Brassen**  
**Andere Namen** : Brachsen, Blei, Bresen, Bressen, Breitling  
**Kennzeichen** : Körper hochrückig, seitlich stark abgeflacht ; Augendurchmesser kleiner als Maulspalte; leicht unterständiges, vorstülpbares Maul; lange Afterflosse (19 bis 23 Strahlen); Brustflossen bis zum Ansatz der Bauchflossen  
**Größe** : können bis 70 cm lang und 6 kg schwer werden  
**Schonzeit**: -  
**Mindestmaß** : - cm  
**Nahrung** : Schlammröhrenwürmer, Insektenlarven,  
**Köder** : Bienenmaden, Maden, Würmer, Mais, Weizen, Brot, Partikelköder